

Prévient les colorations pendant l'utilisation de chlorhexidine.



Respectez toujours les recommandations de votre professionnel dentaire concernant la durée d'utilisation des produits antiseptiques à base de chlorhexidine.



Certains aliments et boissons peuvent aggraver les colorations lors de l'utilisation de chlorhexidine. Un brossage correcte des dents aide à éliminer la plaque dentaire et le tartre, qui contribuent aux colorations.



Utilisez un dentifrice contenant du fluor qui prévient les colorations, puis rincez-vous la bouche avec de l'eau avant d'utiliser un bain de bouche antiseptique. Évitez les dentifrices abrasifs.

VITIS
anti-stain



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vitisforlife.be



Partagez votre expérience avec VITIS Anti-stain et tentez de gagner **une année de dentifrice gratuit !** Scannez le code QR pour participer.



Disponible en pharmacie, chez Medi-Market et sur différents sites de vente en ligne.

DENTAID

Oral health. Better life.

Lichtship 15 • 3991 CP Houten (NL) • TÉL: +31 (0)30 63 43 154
info@dentaid.be • www.dentaid.be



BF4802/03-2025



VITIS
anti-stain

Prévient les colorations dues à l'utilisation de la chlorhexidine, tout en étant doux pour les gencives



Solution de rinçage à la chlorhexidine

La chlorhexidine est un ingrédient antiseptique (désinfectant) présent dans certains bains de bouche pour lutter contre les bactéries dans la bouche. Le bain de bouche à base de chlorhexidine est recommandé pour traiter des affections spécifiques dans la bouche (par exemple une parodontite), après des interventions chirurgicales ou pour réduire le risque d'infection buccale.



Pour soutenir le traitement des affections buccales chroniques (telles que la parodontite) nécessitant un traitement à base de chlorhexidine.



Lors de traitements chirurgicaux parodontaux tels que la chirurgie de décollement, la gingivectomie ou la greffe osseuse.



Dans les procédures d'implantologie ou dans le traitement de la péri-mucosite et de la péri-implantite (inflammation autour d'un implant) nécessitant un soutien à la chlorhexidine.



L'utilisation de chlorhexidine est recommandée chez les patients subissant une intervention chirurgicale maxillo-faciale.

Effets secondaires de la chlorhexidine

La présence de plaque dentaire et/ou la consommation de certains aliments chromogènes (tels que le café, le thé, le vin rouge et les baies) ou de tabac pendant le traitement à la chlorhexidine peuvent entraîner des colorations. Ces colorations ne sont pas permanentes et peuvent être évitées.

Utilisez un dentifrice spécial (contant du fluor) pour prévenir les colorations, puis rincez avant d'utiliser un bain de bouche antiseptique.



VITIS anti-stain

Le dentifrice à utiliser lors d'un traitement à la chlorhexidine

VITIS Anti-stain est le premier dentifrice à usage quotidien, doux pour les gencives, qui prévient les décolorations pendant le traitement à la chlorhexidine. Le dentifrice contient 1 450 ppm de Fluorure.

Formule unique à triple action :



Conseil !

Utilisez VITIS Anti-stain en combinaison avec la **brosse à dents VITIS Surgical** pour un nettoyage ultra doux pendant le traitement.

